

pallide viridis albo-striatus, intus alternatim atropurpureo- et albo-striatus, ca. 6 cm. longus, ad faucem late auriculatus, auriculis intus viridis; lamina galeatoforniculata horizontaliter protensa in lobum oblongo-ovatum ca. 4 cm. longum ca. 5.5 cm. latum verticaliter decurvum apiculo acutum desinens. Spadicis ♀ inflorescentia sessilis, conica, 2.3 cm. longa, 1.5 cm. crassa, stipite 0.5 mm. longo et crasso, appendice 5.5 cm. longo basi 1.3 cm. crasso sursum sensim attenuato apice obtuso. Pistilla oblonga summo rotundata nec pyramidalis, 4-5-ovulata.

The type specimen was collected by Mr. S. OHNUMA from Kôkô near Sinten, Præf. Taihoku, in Taiwan and cultivated in the Botanic Garden of the Taihoku Imperial University, Taihoku. The described species commonly grows in Præf. Taihoku, on the northern of Formosa; and its flowering season continues from January to the beginning of March.

## 雜 錄      Miscellaneous

### ○あさかはさうノ出產屆

武蔵國淺川ノ里近クニ産スルあさかはさう (*Festuca musashiensis* HONDA) ト稱スルー禾本ノ穂ニ仔芽ガ出來テ居ルコトガ近頃 久内清孝氏ノ標本ニヨツテ分ツクノデ取り敢ヘズ紙上ヲ以テ御届ケニ及ビマス。 (本田正次)

### ○ひめすみれさいしん

ひめすみれさいしん (*Viola Yazawana* MAKINO) ハ明治 33-5 年頃數回ニ亘リ信州ノ戸隠山麓デ田中貢一、松岡邦松、矢澤米三郎諸氏ニヨリ發見サレタト傳ヘラレルモノデ、牧野先生ニヨリ命名サレタモノ (植物學雜誌 Vol. XVI, p. 158) デアルガ、其標本ハ廣ク傳ハツテ居ナイ様デアル。マタ、其圖モ見受ケナイガ、明治 36 年 8 月 20 發行ノ田中貢一氏著「信濃ノ花」ニ田中氏ノ詳細ナ記事ト寫生圖ガ出テ居ル。然シテ、其圖ガ參考價值ノアル唯一ノ圖ラシイガ、其書ハ現在デハ稀書ノ部類ニ屬シテ居ルノデ、茲ニ轉寫シテ一般ノ參考ニ資スルコトニシタ。尙此ノ書ニハ其他ノ植物ノ圖モアリ 記事モアルガ同時ニ純粹ニ植物記事ノミヲ書イタモノデナイカラ、植物文獻ニ數ヘ得ルカドウカハ? デアルガ、敍上ノ理由デひめすみれさいしんノ圖丈ハ是非共廣ク一般人士ニ見セテオキタイと思フ。マタ、現時ニ